

↓ Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств.

↓ Назначение

Инсектицид кишечного-контактного и системного действия для защиты зерновых культур от клопа вредная черепашка, хлебной жужелицы; пропашных, овощных — от колорадского жука, проволочника, тлей, капустной мухи, белокрылки; плодовых и декоративных — от медяницы, тли, белокрылки и ряда других вредителей.

↓ Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами)

Совместим с большинством стандартных фунгицидов и инсектицидов. Рекомендуется до начала смешивания проверить компоненты на совместимость.

↓ Период защитного действия

Не менее 14 суток.

↓ Селективность

Не селективен.

↓ Скорость воздействия

Эффект наблюдается через несколько часов после обработки.

↓ Фитотоксичность

Не токсичен для растений в испытанных нормах расхода.

↓ Толерантность культур

При соблюдении регламентов препарата культурные растения проявляют достаточно высокий уровень толерантности к препарату.

↓ Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения устойчивости к препарату необходимо его чередование с инсектицидами из других химических групп.

↓ Технология применения

Рабочая жидкость должна приготавливаться на специально оборудованных стационарных заправочных узлах, имеющих резервуары с механическими мешалками. Первоначально резервуар заполняют на одну треть емкости водой, затем при включенной мешалке постепенно вливают необходимое количество препарата, после чего резервуар наполняют водой до расчетного уровня и тщательно перемешивают. Приготовленную рабочую жидкость насосами подают к местам обработок. При необходимости использования ОЗГ его заправка проводится тут же. При отсутствии средств механизации приготовления рабочих растворов препарата не допускается. Во время приготовления рабочего раствора и заправки опрыскивателей не допускается пролив рабочей жидкости. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. В сельскохозяйственном производстве используют серийно выпускаемые опрыскиватели, оборудованные наконечниками, предназначенными для применения инсектицидов.

↓ Хранение препарата

Хранить препарат на сухом складе для пестицидов при температуре от -10°C до +35°C в невскрытой заводской упаковке.

↓ Срок хранения

4 года